



## महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी

### करोनाचे पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थितीत शेतीचे नियोजन

#### गहू

- 1) उशिरा गव्हाची पेरणी केली असेल व गहू पीक शेतात सध्या उभे असेल तर कंबाईन हारवेस्टरच्या सहाय्याने काढणी करून घ्यावी.
- 2) कंबाईन हारवेस्टरची उपलब्धता नसल्यास मंजुरांमध्ये योग्य ते अंतर ठेवून शक्य तितक्या कमी मजुरांच्या सहाय्याने गव्हाची कापणी व मळणी करून घ्यावी.
- 3) कृषि उत्पन्न बाजार समिति बंद असल्यास गव्हाची योग्य पद्धतीने वाळवणी करून सेल्फॉस वापरून गोदामात साठवणूक करावी
- 4) काढणी पश्चात गव्हाचे काड न जाळता, जमिनीची नांगरणी करून शेत पुढील हंगामासाठी तयार ठेवावे.

#### ऊस

- 1) सुरु उसाची लागण झालेल्या क्षेत्रात पिक ४ महिन्यांचे होईपर्यंत खुरपणी व कोळपणी करून तण विरहीत ठेवावे.  
उन्हाळा चालू झाल्याने उसाला योग्य वेळेच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या घाव्यात . ऊस पिकास पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करावा. पाणी कमी असल्यास सरी वरंबा पद्धती मध्ये एक आड एक सरीस पाणी द्यावे.
- 2) सुरु हंगामी लागवड केलेल्या उस पिकाच्या लागणीस ६ ते ८ आठवडे झाले असल्यास नत्र खताचा दुसरा हसा १०० किलो नत्र (युरिया २१७ किलो) प्रती हेक्टरी या प्रमाणात द्यावा.

#### उन्हाळी भुईमूग

- 1) उन्हाळी भुईमूगाच्या आ.या जमिनीत जाण्यास सुरुवात झाल्यावर आंतरमशागत करू नये-
- 2) उन्हाळी भुईमूगाच्या आ या जमिनीत-जाण्याच्या वेळी ते शेंगा पोसण्या च्या कालावधीत पिकास पाण्याचा ताण पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- 3) भुईमूगास शक्य असल्यास स्पिंकलर पद्धतीने पाणी द्यावे.
- 4) उशिरा भुईमूग पेरणी झाली असल्यास झाडांना माती लावावी.

- 5) भुईमूग पिकावर टिक्का रोग येऊ नये म्हणून कार्बेन्डाझिम 4 मिली प्रती लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
- 6) पाने खाणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी क्लोरपायरीफॉस २० मिली १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. टिक्का रोग नियंत्रणासाठी मॅकोझेब २ ग्रॅम प्रतिलिटर १ ग्रॅम किंवा कार्बेन्डाझिम ५. पाण्यातून फवारावे.
- 7) शेंगा तयार होत असताना जास्तीत जास्त शेंगा तयार होण्यासाठी ७० ग्रॅम ००:५२:३४, ५० ग्रॅम मल्टीमायक्रोन्युट्रीएंट/१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

## भाजीपाला

- 1) सततच्या वाढत्या तापमानामुळे सर्व भाजीपाला पिकात पाण्याचे योग्य नियोजन करावे.
- 2) कांदा काढणी साठी आला असल्यास काढणी करून शेतात 3 ते 4 दिवस सुकवावा नंतर पात कापून 3 आठवडे सावलीत सुकवावा तदनंतर प्रतवारी करून साठवणूक करावी.
- 3) लसूण काढणी झाल्यानंतर पातीचा रंग परतल्यानंतर जुड्या बांधून हवेशीर ठेवावा.
- 4) गवार पिकाची तोडणी वेळोवेळी करावी.
- 5) भेंडी पिकावरील रस शोषण करणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास डायमिथोएट 30 ई.सी., 15 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यातून फवारणी करावी.
- 6) भाजीपाला पिकातील तण काढून घ्यावे त्यामुळे कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव होणार नाही.
- 7) वेल वर्गीय पिकामध्ये रस शोषून घेणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास डायमिथोइट 30 किंवा इमिडक्लोप्रिड 17.8 % एस एल 5 मिली व डायथेन एम 45 (25 ग्रॅम) ची फवारणी प्रती 10 लिटर पाण्यातून हातपंपाने करावी.
- 8) भेंडी .भोपळा इ ,वांगी ,भाजीपाला पिकावरील रस शोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी ५ निंबोळी % अर्काची किंवाफिप्रोनिल २५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी तसेच . भाजीपाला पिकावरील कोळीच्या नियंत्रणासाठी फेनप्रोपॅथीन ३० .सी.ई %, ५ मिली किंवा डायकोफॉल १८.सी.ई %५., २० मिली प्रती १० लिटर पाण्यातून फवारावे.

## डाळिंब

- 1) डाळींबाचा आंबे बहार घेतला असल्यास ठिबकद्वारे पाणी व्यवस्थापन करावे खत व्यवस्थापनासाठी फेर्टीगेशन तंत्राचा वापर करावा.
- 2) ब्लोअर च्या सहाय्याने कीटक / रोग नाशकाची फवारणी करावी

- 3) बागेत दोन ओळीत गवत वाढले असल्यास ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने फणनी किंवा रोटोवेटरच्या तण काढावे.
- 4) उन्हापासून फळाचे संरक्षण होण्यासाठी फळांना कागदी पिशव्या अथवा जुन्या कापडी पिशव्या चे फळांना आच्छादन करावे.
- 5) तेलकट डाग रोग नियंत्रणासाठी झाडांची नैसर्गिकरीत्या पानगळ होईपर्यंत ताण घावा पानगळ . झालेल्या काड्याच्या शेंड्याकडील भाग वाळून जाई पर्यंत ताण घावा त्यामुळे काड्यांमधील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने तसेच उच्च तापमानामुळे डोळ्यांजवळ असणारे जीवाणू मरून जातील व पुढील बहारा मध्ये रोगाचे प्रमाण कमी होईल .
- 6) बहार छाटणी करतेवेळी शेंड्याकडील १० ते १५ से.मी. लांबीचा भाग छाटून काढावा तसेच शिफारशीत खतांची मात्रा देवून नियमित पाणीपुरवठा करावा.
- 7) सूत्रकृमींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास १३५ किलो कार्बोफ्युरॉन ३ जी प्रति हेक्टरी झाडांभोवती रिंग पद्धतीने पुरेसा ओलावा असताना टाकून झाकावे.

## द्राक्ष

- 1) फळाच्या काढणीस अडथळा आल्या कारणाने शेतकरीबंधूनी आपले नुकसान टाळण्या करिता सध्याचा झाडावरील द्राक्षमाल बेदाण्या मध्ये परिवर्तित करण्यासाठी उपाय योजना करावी .
- 2) पूर्ण काढणी झाली असल्यास व पुढील १० दिवसांनी खरड छाटणी करण्याचे नियोजन असेल १५- तरतत्पुर्वी जमिनीचे व पाण्याची अन्नद्रव्य व खताच्या नियोजनासाठी तपासणी करून घ्यावी.

## केळी

- 1) केळीच्या बुंदयाजवळ वाढणारी पिल्ले नियमित कापावीत तसेच केळीवरील जुनी वाळलेली व रोगट पाने कापून बाग स्वच्छ ठेवावी.
- 2) ठिबक सिंचन द्वारे पाणी व्यवस्थापन करून बाग वापस्यावर राहिल याची काळजी घ्यावी
- 3) केळीचा घड निसवल्यावर केळफूल कापावीत .
- 4) केळीच्या घडाचे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठी केळीच्या वाळलेल्या पानांची पेंडी करून केळीचा घड व घडाचा दांडा झाकावा.
- 5) केळीचा घड पूर्ण निसवल्यावर त्यावर 0.5 % पोटॅशियम डायहैड्रोजन फॉस्फेट +1 % युरिया + स्टिकर अथवा 10 पीपीएम 2-4-डी द्रावणाची फवारणी केल्याने केळी घडाच्या आकारमानात व गुणवत्तेत वाढ होईल.
- 6) वजनाने मोठ्या असलेल्या घडास बांबूच्या सहाय्याने टेकू घावा.

- 7) खोडवा पीक घेण्यासाठी मुख्य बागेची 70 - 75 टक्के निसवन झाल्यावर खोडवा धरावा त्यासाठी केली घडाच्या विरुद्ध बाजूचे एकसारख्या उंचीचे तलवारीच्या पात्यासारखी पाने असणारे पिल्ले राखावीत.

## आंबा

- 1) नवीन लागवड केलेल्या आंबा कलमांना वार्यापासून संरक्षणासाठी काठीचा आधार द्यावा .
- 2) मोठ्या झाडांना फळधारणेनंतर जमिचा प्रकार, झाडाचे वय, पाण्याची उपलब्धता ई. विचारात घेवून योग्य वेळेच्या अंतराने पाण्याच्या पाळ्या द्याव्यात.
- 3) बाष्पीभवनाचा वेग वाढलेला आहे त्यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी होऊ नये म्हणून फळझाडांच्या खाली वाळलेली पाने, तूर काड्या, उसाचे वाळलेले पाचट इ. चे आच्छादन करावे.

## लिंबू वर्गिय पिके

- 1) काळी माशीच्या नियंत्रणासाठी १५ ग्रॅम अॅसिफेट ७५% पाण्यात मिसळणारी पावडर प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

## पाळीव जनावरे (गाई म्हशी शेळ्या मेंढ्या इत्यादी)

- 1) जनावरांच्या गोठ्यात स्वच्छता राखावी.
- 2) बाहेरून आल्यावर हातपाय स्वच्छ धूवूनच गोठ्यात जावे.
- 3) गोठ्यात चूना भुरभुरावा.
- 4) जनावरांना दिवसभर पिण्याचे पाणी हवे तेव्हा मिळेल याची सोय करावे.
- 5) चा-याचा तुटवडा भासु नये यासाठी शेतातील दुय्यम पदार्थ जसे गव्हाचे काड, हरभरा , तुर, इ चा भुसा साठवून ठेवा. तसेच मुरघास (silage) तयार करून ठेवावा.
- 6) दुपारच्या वेळी जनावरांना हिरवा मका, चवळी, कडवळ, लसूणघास यासारखे पोषण वैरण द्यावी .
- 7) जंताच्या व विविध आजाराच्या नियंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहाय्याने जंतनाशक व लसीजनावरांना पाजावे/ टोचून घ्यावे.
- 8) पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानुसार शेळ्यांना स्ट्रॅंगार्डल (गोलकृमी) या जंताच्या निर्मुलानाठी एप्रिल महिन्यामध्ये फेनबेन्डाझोल हे जंतनाशक द्यावे.
- 9) उन्हाळ्याच्या सुरवातीस एप्रिल महिन्यामध्ये मेंढ्यांना देवी या रोगाची प्रतिबंधक लस टोचून घ्यावी.