

रब्बी ज्वारी

उत्पादन वाढीची सूत्रे :

- १) सुधारीत वाण : कोरडवाहू - मालदांडी - ३५-१, परभणी मोती, फुले चित्रा, फुले अनुराधा
: बागायतीसाठी - परभणी ज्योती
- २) पेरणीची योग्य वेळ : १५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर
- ३) बीज प्रक्रिया : काणी रोगाचा आणि खोडमाशी मुळे होणारी पोंगामर कमी करण्यासाठी ३०० मेश गंधक ४ ग्रॅम आणि थायोमिथोक्झाम (कूझर) ३ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास पेरणीपूर्वी बिजप्रक्रिया करावी.
- ४) रासायनिक खत्रे : कोरडवाहू - पेरणीच्यावेळी २०:२०:०० खत एकरी ४० किलो पेरुण घ्यावे.
बागायती - पेरणीवेळी एकरी २०:२०:०० खत ७५ किलो व सोबत २५ किलो म्युरेट ऑफ पोटॅश घ्यावे.
- ५) मुलस्थानी जलसंधारण : कोळपण्या संपल्यानंतर प्रत्येक चार ओळीनंतर बळीराम नांगराने एक सरी पाडून घ्यावी.
- ६) संरक्षित पाणी : पोटरी अवस्थेत एक संरक्षित पाणी द्यावे. (पेरणीनंतर ५० ते ५५ दिवसांनी)

हरभरा

उत्पादन वाढीची सूत्रे :

- १) सुधारीत वाण : कोरडवाहूसाठी - विजय
बागायतीसाठी - दिग्वीजय, आकाश
- २) बीज प्रक्रिया : १) ०२ ग्रॅम कार्बोन्डॅझीम + २ ग्रॅम थायरम प्रति किलो बियाण्यास
चोळावे
२) नंतर रायझोबियम, पी एस बी व ट्रायकोडर्मा प्रत्येकी ६
मि.ली. प्रति किलो बियाणे याप्रमाणे बीजप्रक्रिया
- ३) पेरणीची वेळ : कोरडवाहू - ऑक्टोबरच्या दूसऱ्या पंधरवाड्यात
बागायती - १५ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर
- ४) पेरणी : पेरणी बी बी एफ वर करावी किंवा चार ओळीनंतर एक ओळ
सोडून पेरणी करावी.
- ५) रासायनिक खते : पेरणीच्या वेळी डी.ए.पी. ५० किलो प्रति एकरी पेरून दयावा.
- ६) संरक्षित पाण्याची पाळी : तूषार पध्दतीने दोन संरक्षित पाणी घ्यावे.
(२५ टक्के फुलोरा व घाटे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये)
- ७) पीक संरक्षण : १) पीक एक महिन्याचे झाल्यानंतर एकरी २० पक्षीथांबे लावावेत
२) फुलोरा अवस्था - घाटे अळीसाठी इमामेक्टीन बेंझोएट ०४
ग्रॅम किंवा क्विनॉलफॉस २० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून
फवारावे.
३) घाटे भरताना - क्लोरॅनट्रीनीलीप्रोल (कोराजन) २.५ ग्रॅम प्रति
१० लिटर पाण्यातून फवारावे. (पेट्रोल पंपासाठी किटकनाशकाचे
प्रमाण तिप्पट करावे.)

करडई

उत्पादन वाढीची सूत्रे :

- १) सुधारित वाण : शारदा, परभणी - ४०, परभणी -१२
- २) पेरणीची वेळ : सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा ते ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा
- ३) बीजप्रक्रिया : ३ ग्रॅम बावीस्टीन प्रति किलो बियाण्यास चोळावे.
- ४) आंतरपीक पध्दती : हरभरा + करडई (६ : ३)
- ५) रासायनिक खते : पेरणीच्यावेळी एकरी ४० किलो युरिया आणि ५० किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट पेरून द्यावे.
- ६) पाणी व्यवस्थापन : तूषार सिंचन पध्दतीने पहिले पाणी ३० ते ४० दिवसानी आणि दूसरे पाणी ६० ते ६५ दिवसानी द्यावे.
- ७) पीक संरक्षण : १) मावा किडीसाठी - डायमिथोएट १५ मिली प्रति १० लिटर पाणी.
२) पानावरील ठिपक्यासाठी डायथेन एम-४५ बुरशीनाशक २५ ग्रॅम प्रति १० लिटर पाणी याप्रमाणे फवारणी घ्यावी.

तुर

तुर या पीकामधील किड व्यवस्थापन :

किड	फवारणीची वेळ	किटकनाशक	प्रमाण प्रति १० लिटर पाणी
शेंगा पोखरणारी किड (शेंगा पोखरणारी अळी, पिसारी पतंग, शेंगमाशी, पाने व फूले जाळी करणारी अळी)	पहिली फवारणी पिकास फुलकळी येऊ लागताच	५ टक्के निंबोळी अर्क + ०.२५ टक्के साबन चुरा + क्विनॉलफॉस	२५ मिली + २५ ग्राम + २० मिली
	दुसरी फवारणी शेंगात दाणे भरताना घ्यावी.	इमामेक्टीन बेंझोएट ५ टक्के किंवा फ्ल्युबेंडामाईड ३९.३५ टक्के	४ मिली ०२ मिली

सुर्यफल

- वाण** : मॉर्डन, इसी ६८४१४, एसएस-५६ व एलएस-११ हे सरळा वाण तसेच एलएसएफएच - ३५ महिको १,८,१७ व इतर संकरवाण पेरणीसाठी निवडावे.
- बियाणे** : संकर वाणाचे हेक्टरी ५ किलो व सरळ वाण्याचे हेक्टरी ८ ते १० किलो बियाणे पेरावे.
- बीजप्रक्रिया** : पेरणीपूर्वी बियाणास थायरम ३ ग्रॅम किंवा बावीस्टीन २ ग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात लावावे.
- पेरणीची वेळ** : सुर्यफुलाची पेरणी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवाड्यात करावी किंवा उशीरात उशीरा ऑक्टोबर अखेर पर्यंत संपवावी.
- अंतर** : १) सुर्यफुलाच्या संकर वाणासाठी ६० X ३० सें.मी. व सरळ वाणासाठी ४५ X २२.५ सें.मी. अंतरावर टोकण पध्दतीने करावी किंवा सरळ वाणाची पेरणी तिफणीने करावयाची असल्यास ४५ से.मी. अंतरावर करावी.
२) पेरणीपूर्वी सरी वरंबे रिझरच्या साहयाने पाडून सरीच्या बगलेत एका ठिकाणी दोन बिया टोकाव्यात.
- रासायनिक खते** : पेरणीच्या वेळी हेक्टरी ३० किलो नत्र, ३० किलो स्फुरद आणि ३० किलो पालाश पेरणीच्या वेळी द्यावे.
- विरळणी** : पेरणी नंतर १० ते १२ दिवसांनी पिकाची विरळणी करुन एके ठिकाणी एक जोमदार रोप ठेवावे.
- पाणी व्यवस्थापन** : १) पेरणीच्या वेळी जमिनीत भरपूर ओलावा नसल्यास प्रथम रान ओलावून घ्यावे व चांगला वापसा आल्यावर पेरणी करावी.

कापूस

- १) पावसाचा खंड १५ ते २० दिवसाचा पडला असल्यास व पाणी देण्याची सोय असल्यास पिकास पाणी द्यावे.
- २) पाऊस जास्त पडून शेतात पाणी साचले असल्यास ते पाणी शेताच्या बाहेर काढावे.
- ३) पिकावर बोंड अळीचा प्रादूर्भाव आढळल्यास खालील प्रमाणे उपाय करावेत.
अ) फेनप्रोपॅथ्रीन १० ई.सी. १० मिली किंवा पायरीप्रॉक्सीफेन ५ टक्के + फेनप्रोपॅथ्रीन १५ टक्के ई.सी. १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारावे.
- ४) कामगंध सापाळयातील ल्यूर प्रत्येक २१ दिवसांनी बदलून घ्यावे.
- ५) पांढऱ्या माशीचा प्रादूर्भाव आढळल्यास डायफेन्थीरॉन ५० टक्के wp १० मि.ली. प्रति १० लि.पाण्यात मिसळून फवारावे.
- ६) मूळ कूजव्या रोगाचा प्रादूर्भाव आढळल्यास कॉपरअॅक्सीक्लोराईड २५ ग्रॅम १० लिटर पाण्यात मिसळून झाडास ड्रॅचींग करावी.
- ७) आकस्मिक मरची लक्षणे दिसू लागताच १.५ किलो युरिया + १.५ किलो पालाश १०० लिटर पाण्यात मिसळून १५० ते २०० मि.ली. द्रावणाची प्रति झाड आळवणी करावी. त्यानंतर ८-१० दिवसांनी २ किलो डिएपी १०० लिटर पाण्यात मिसळून हे द्रावण १५० ते २०० मिली झाडाच्या बुंध्याजवळ ओतावे व लगेचच पाणी द्यावे.